

PTI en el embarazo  
Image



## **Trombocitopenia inmune primaria en el embarazo**



## VIDEO

Image



**Dra. Laura Entrena Ureña**

Hematóloga

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

En este video se realizará una actualización de las recomendaciones del Grupo Español de PTI sobre la trombocitopenia inmune primaria en el embarazo.

- La trombopenia es la segunda alteración hematológica más frecuente en gestantes, afectando a 1 de cada 10 mujeres durante la gestación.
- Por regla general, cifras de plaquetas  $> 20-30 \times 10^9/L$  no requieren tratamiento de forma sistemática.
- La cifra de plaquetas recomendada en partos vaginales debe ser  $> 50 \times 10^9/L$  y en la cesárea o anestesia epidural  $> 80 \times 10^9/L$  aunque se considera seguro para parto vaginal un recuento plaquetario  $\geq 30-50 \times 10^9/L$ , para la cesárea  $\geq 50 \times 10^9/L$  y para

la anestesia epidural  $\geq 70 \times 10^9/L$ .

- La primera línea de tratamiento son los glucocorticoides y las Inmunoglobulinas.
- Se recomienda una dosis inicial de prednisona de 10-20 mg/día y mantener la menor dosis eficaz posible, reservando el uso de las Igsi hay efectos secundarios, hemorragia grave o elevación rápida de plaquetas con vistas al parto.
- En cuanto a las siguientes líneas de tratamiento la azatioprina y la ciclosporina podrían usarse sin riesgo de teratogenicidad y los agentes trombopoyéticos podrían ser utilizados con precaución, preferiblemente en el tercer trimestre

Image



## Directrices de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la PTI

PDF

[Descargar](#)




Con receta Médica. Uso hospitalario. Reembolsado por el SNS. PVLn REVOLADE 25 MG 28 COMPRIMIDOS 843,62 €. PVLn REVOLADE 50 MG 28 COMPRIMIDOS 1.687,24 €. PVLn REVOLADE 25 MG 30 SOBRES SUSPENSION ORAL 903,4 €.

[Ficha técnica de Revolade® Comprimidos](#)

Con receta Médica. Uso hospitalario. Reembolsado por el SNS. PVLn REVOLADE 25 MG 28 COMPRIMIDOS 843,62 €. PVLn REVOLADE 50 MG 28 COMPRIMIDOS 1.687,24 €. PVLn REVOLADE 25 MG 30 SOBRES SUSPENSION ORAL 903,4 €.

[Ficha técnica de Revolade® Suspensión oral](#)



Contenido basado en las recomendaciones generales del GEPTI, Grupo de Trabajo de la SEHH<sup>1</sup>.

GEPTI: Grupo Español de Trombocitopenia Inmune; PTI: trombocitopenia inmune primaria; SEHH: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

## **Referencia**

1. **Grupo de Trabajo de la SEHH y GEPTI. Directrices de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la PTI. 2023. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).**

---

**Source URL:**

<https://prod.pro.novartis.com/es-es/hematopro/patologias/pti/pti-recursos-para-profesionales/opinion-de-expertos-sobre-pti/pti-en-el-0>