

Tafinlar[®] + **Mekinist**[®]
(dabrafenib) (trametinib)



DATOS A
5
AÑOS¹

Certezas de Tafinlar[®] +
Mekinist[®] en pacientes
largos supervivientes

ES2307282035

Pacientes largos supervivientes



Características de los pacientes largos supervivientes



Respuesta al tratamiento de los pacientes largos supervivientes



Posología cómoda




Conclusiones



▶ **Pacientes largos supervivientes**


El **34 %** de los pacientes tratados con Tafinlar® + Mekinist® continúan vivos a los 5 años.¹

Los pacientes largos supervivientes tratados con Tafinlar® + Mekinist® son los que siguen vivos a los 5 años:¹



43 %

de los pacientes largos supervivientes **continúan con Tafinlar® y Mekinist®, en combinación o monoterapia, en primera línea.**¹




12,4 %

de los pacientes largos supervivientes **han podido discontinuar Tafinlar® y Mekinist® y siguen vivos sin tratamiento.**¹

▶ Características de los pacientes largos supervivientes

Niveles LDH:¹

■ Normal	86 %
■ Por encima del límite	14 %
■ 2 o más veces por encima del límite	1 %




Estado funcional:¹

■ ECOG 0	88 %
■ ECOG 1 o mayor	11 %
■ Sin datos	1 %

Estadio de la metástasis:¹

■ M0	7 %
■ M1a	23 %
■ M1b	23 %
■ M1c	47 %




Localizaciones metastásicas:¹

■ <3	73 %
■ ≥3	27 %


ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; LDH: lactato deshidrogenasa.

▶ Respuesta al tratamiento de los pacientes largos supervivientes

📍 El **90 %** de los pacientes largos supervivientes con Tafinlar® + Mekinist® tienen respuesta objetiva.¹



Respuesta al tratamiento de los pacientes largos supervivientes:¹



La mediana de tiempo para alcanzar RC fue de **5,6 meses**.²

EE: enfermedad estable; PE: progresión de la enfermedad; RC: respuesta completa; RP: respuesta parcial.




► Respuesta al tratamiento de los pacientes largos supervivientes

📍 El **36,6 %** de los pacientes largos supervivientes con Tafinlar® + Mekinist® no muestran progresión de la enfermedad a los 5 años.¹



Respuesta al tratamiento de los pacientes largos supervivientes sin progresión de la enfermedad:¹




EE: enfermedad estable; PE: progresión de la enfermedad; RC: respuesta completa; RP: respuesta parcial.



► Posología cómoda

📍 Tafinlar® + Mekinist® es una **terapia cómoda para el paciente.**³⁻⁹



Tafinlar® + Mekinist® es la terapia dirigida para melanoma metastásico con menor número de comprimidos (solo 5 comprimidos al día).⁴⁻⁹




Tafinlar® + Mekinist® podría ser una opción terapéutica preferida por los pacientes frente a tratamientos con mayor número de pastillas y/o tratamientos IV.³


Más información sobre preferencias de los pacientes³



IV: intravenoso.



► Preferencias de los pacientes sobre la posología de los tratamientos³



IV: intravenoso.

► Conclusiones



El **34 %** de los pacientes tratados con Tafinlar[®] + Mekinist[®] continúan vivos a los 5 años.¹



El **90 %** de los pacientes largos supervivientes con Tafinlar[®] + Mekinist[®] tienen respuesta objetiva.¹



El **43 %** de los pacientes largos supervivientes continúan con Tafinlar[®] y Mekinist[®], en combinación o monoterapia, en primera línea.¹



El **12,4 %** de los pacientes largos supervivientes han podido discontinuar Tafinlar[®] y Mekinist[®] y siguen vivos sin tratamiento.¹

▶ Referencias

1. Robert C, Grob JJ, Stroyakovskiy D, *et al.* Five-Year Outcomes with Dabrafenib plus Trametinib in Metastatic Melanoma. *N Engl J Med.* 2019;381(7):626-36.
2. Robert C, Grob JJ, Stroyakovskiy D, *et al.* Characteristics of Patients With a Complete Response Treated With Dabrafenib + Trametinib Combination Therapy: Findings From Pooled COMBI-d and COMBI-v 5-Year Analysis. Presented at 16th International Congress of the Society for Melanoma Research (SMR); November 20-23, 2019; Salt Lake City, UT.
3. Mansfield C, Ndife B, Chen J, *et al.* Patient preferences for treatment of metastatic melanoma. *Future Oncol.* 2019;15(11):1255-68.
4. Ficha Técnica Tafinlar®. Novartis Europharm Ltd. Publicada en la web de la EMA.
5. Ficha Técnica Mekinist®. Novartis Europharm Ltd. Publicada en la web de la EMA.
6. Ficha Técnica Zelboraf®. Roche Registration Limited. Publicada en la web de la EMA.
7. Ficha Técnica Cotellic®. Roche Registration Limited. Publicada en la web de la EMA.
8. Ficha Técnica Braftovi®. Pierre Fabre Médicament. Publicada en la web de la EMA.
9. Ficha Técnica Mektovi®. Pierre Fabre Médicament. Publicada en la web de la EMA.