

Información importante

Reacciones alérgicas,
incluida la anafilaxia





Debe estar informado sobre las reacciones alérgicas y la anafilaxia

Xolair® contiene una proteína, y las proteínas pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Los síntomas de una reacción alérgica se desarrollan generalmente pocos minutos después de la administración, aunque también pueden desarrollarse gradualmente durante un período de varias horas.



Los síntomas comunes de una reacción alérgica son:

- Sibilancia, opresión en el pecho y tos
- Enrojecimiento, erupción, prurito (urticaria)
- Hinchazón de labios, lengua, ojos o cara
- Dolor de estómago, sensación de malestar, vómitos o diarrea

En raras ocasiones, estas reacciones alérgicas pueden ser graves (ocasionalmente llamadas anafilaxia). Si tiene antecedentes de reacciones alérgicas graves no relacionadas con Xolair[®], puede tener un mayor riesgo de desarrollar una reacción alérgica grave después de la administración de Xolair[®].

Los síntomas de las reacciones alérgicas graves (incluida la anafilaxia) incluyen cualquiera de los síntomas anteriores, además de:

- Hinchazón de boca y garganta
- Dificultad en la respiración
- Aturdimiento
- Confusión
- Tono de piel azulado
- Pérdida de la conciencia y desmayo



¿Son frecuentes las reacciones alérgicas graves?

La anafilaxia, una forma de reacción alérgica grave, es poco frecuente en pacientes tratados con Xolair®, dándose en menos de 2 personas de cada 1.000, pero es importante que sepa qué hacer en caso de que fuera necesario.

2 de cada 1.000


Si tiene cualquier síntoma de reacción alérgica después de la administración de Xolair®, contacte inmediatamente con un médico.



¿Cuándo puede producirse una reacción alérgica?

Los síntomas de una reacción alérgica suelen desarrollarse pocos minutos después de la administración, aunque también pueden desarrollarse gradualmente durante un período de varias horas.

La mayoría de las reacciones anafilácticas suelen producirse en las 3 primeras dosis de Xolair®, por lo que estas deben ser administradas o supervisadas por su profesional sanitario.



¿Qué debe hacer si cree que está sufriendo una reacción alérgica grave?

Si experimenta cualquier signo o síntoma de una reacción alérgica grave, contacte inmediatamente con un médico.

- Informe de que cree que está sufriendo una reacción alérgica grave debido a su tratamiento con Xolair®
- Tumbese en el suelo. Si tiene dificultad para respirar, siéntese (puede ayudar a facilitar la respiración)
- Si su médico le ha proporcionado una jeringa de adrenalina, siga sus instrucciones
- Los antihistamínicos pueden aliviar las reacciones alérgicas de leves a moderadas

También es buena idea que sus amigos, familiares y compañeros de trabajo tengan conocimiento de que existe el riesgo de sufrir reacciones alérgicas graves después de la administración de Xolair®. Enséñeles este material para que puedan familiarizarse con los signos y síntomas de estas reacciones alérgicas y así aprender cómo manejar la situación.

¿Cuándo es necesario que contacte con su médico?

Contacte con su médico inmediatamente si sufre signos o síntomas de una reacción alérgica.



En cualquier caso, debe informar a su médico de cualquier reacción alérgica antes de la administración de su siguiente dosis de Xolair®.

Si sufre cualquier otro efecto adverso tras la administración de Xolair®, comuníquesele a su médico en la siguiente cita médica.



Contactos útiles

Mi especialista

Nombre:

Detalles de contacto:

Mi enfermera

Nombre:

Detalles de contacto:

Mi médico de atención primaria

Nombre:

Detalles de contacto:

Bibliografía:

Omalizumab and the risk of an allergic reaction (anaphylaxis).

Disponible en: www.oxfordradcliffe.nhs.uk. Último acceso: Octubre 2018.

Treatment Allergies. Disponible en: www.nhs.uk. Último acceso: Octubre 2018.

Treatment Anaphylaxis. Disponible en: www.nhs.uk. Último acceso: Octubre 2018.

Ficha técnica de Xolair®.

Fecha de preparación: **Abril 2023**

ES2304121939