


STEP 1	エンレスト錠100mg、4錠を乳鉢に取り、乳棒を用いて細かい粉状になるまで粉碎します。	
STEP 2	メスシリンダーを用い、単シロップの必要量100mLの1/3量を加えて10分間混和します。	
STEP 3	単シロップの必要量100mLの2/3量を加えて10分間混和し、懸濁液（4mg/mL）とします。	
STEP 4	清潔なポリプロピレン（PP）製ボトルに調製した懸濁液を移します。ボトルの口または表面に液が残っていないことを確認し、キャップをしてください。最後に、ボトルをよく振り混ぜてください。	

Image

STEP 1



エンレスト錠100mg、4錠を乳鉢に取り、
乳棒を用いて細かい粉状になるまで粉碎します。

STEP 2



メスシリンダーを用い、単シロップの必要量100mLの1/3量を加えて
10分間混和します。

STEP 3



単シロップの必要量100mLの2/3量を加えて10分間混和し、
懸濁液（4mg/mL）とします。

STEP 4



清潔なポリプロピレン（PP）製ボトルに調製した懸濁液を移します。
ボトルの口または表面に液が残っていないことを確認し、
キャップをしてください。
最後に、ボトルをよく振り混ぜてください。

エンレスト P8 100mL

Source URL:

https://prod.pro.novartis.com/jp-ja/products/entresto/pediatric_heart_failure/administration_02