

□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

日常生活に影響を与える
可能性のある症状

88%の患者さん
貧血(Hb 13g/dL未満[男性]、
12g/dL未満[女性])が
みられる⁶。

83%の患者さん
生活に支障をきたす恐れのある
倦怠感がみられる²。

45%の患者さん
ヘモグロビン尿、または溶血による
濃い色の尿がみられる²。



生命を脅かす
可能性のある合併症

40%の患者さん
血栓性合併症がみられる⁶。

65%の患者さん
慢性腎臓病がみられる^{7,8}。

47%の患者さん
肺高血圧症がみられる⁹。

PNH □□□□

PNH □□□□

□□□□□□PNH□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□

Life With PNH
PNHと私の大切な家族



□□□□



エキスパートに聞く

臨床成績解説

症例を読み解く

ガイドライン解説

□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□

□□□□ □□□□□□□□

メール配信サービス



presented by Novartis

□□□□

Source URL: <https://prod.pro.novartis.com/jp-ja/products/fabhalta/disease>