









項目		ベオビュ 6mg群 (n=179)	アフリベルセプト 2mg群 (n=181)
性別、症例数 (%)	男性	120 (67.0)	115 (63.5)
	女性	59 (33.0)	66 (36.5)
年齢、症例数 (%)	<65歳	100 (55.9)	102 (56.4)
	≧65歳	79 (44.1)	79 (43.6)
	平均値±標準偏差	62.3±10.55	62.2±9.48
糖尿病の型、症例数 (%)	1型	19 (10.6)	7 (3.9)
	2型	160 (89.4)	174 (96.1)
HbA1c (%), 平均値±標準偏差		7.55±1.174	7.46±1.161
糖尿病黄斑浮腫の罹病期間 (ヵ月), 平均値±標準偏差		10.4±16.56	9.9±20.73
最高矯正視力スコア (文字), 平均値±標準偏差		66.0±10.77	63.7±11.70
黄斑浮腫の種類、症例数 (%)		(n=178)	(n=175)
	局所性	63 (35.4)	66 (37.7)
	びまん性	115 (64.6)	109 (62.3)
中心窩網膜厚 (μm), 平均値±標準偏差		(n=179) 481.1±132.46	(n=180) 484.4±134.58
フルオレセイン血管造影での 血管漏出、症例数 (%)		(n=178)	(n=175)
	あり	178 (100)	175 (100)
	なし	0 (0.0)	0 (0.0)
IRF、症例数 (%)	あり	176 (98.3)	179 (98.9)
	なし	3 (1.7)	2 (1.1)
SRF、症例数 (%)	あり	56 (31.3)	67 (37.0)
	なし	123 (68.7)	114 (63.0)
ETDRS糖尿病網膜症重症度、 症例数 (%)		(n=176)	(n=177)
	1. 網膜症なし	3 (1.7)	1 (0.6)
	2. 毛細血管瘤のみ	0 (0.0)	2 (1.1)
	3. 軽症非増殖網膜症	49 (27.8)	37 (20.9)
	4. 中等度非増殖網膜症	55 (31.3)	68 (38.4)
	5. 重・中等度非増殖網膜症	30 (17.0)	20 (11.3)
	6. 重症非増殖網膜症	26 (14.8)	34 (19.2)
	7. 軽症増殖網膜症	9 (5.1)	7 (4.0)
	8. 中等度増殖網膜症	3 (1.7)	5 (2.8)
	9. 危険な増殖網膜症	1 (0.6)	2 (1.1)
	10. 非常に危険な増殖網膜症	0 (0.0)	0 (0.0)
	11. 進展した増殖網膜症	0 (0.0)	1 (0.6)
12. 非常に進展した増殖網膜症	0 (0.0)	0 (0.0)	

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

---

**Source URL:** [https://prod.pro.novartis.com/jp-ja/products/beovu/dme/clinical\\_04](https://prod.pro.novartis.com/jp-ja/products/beovu/dme/clinical_04)