

B-ALL

再発又は難治性のCD19陽性のB-ALL患者

■ ELIANA試験

ELIANA試験で使用頻度が高かった薬剤(15%以上)

薬剤名	n(%)
メトトレキサート	49 (65.3)
シタラビン	47 (62.7)
ビンクリスチン	40 (53.3)
シクロホスファミド	30 (40.0)
メルカプトプリン	27 (36.0)
デキサメタゾン	25 (33.3)

薬剤名	n(%)
エトポシド	24 (32.0)
ペグ化アスパラガーゼ (国内未承認)	18 (24.0)
ヒドロコルチゾン	17 (22.7)
プレドニゾン	14 (18.7)

※ブリッジング療法で使用できる薬剤には、制限がありません
※ブリッジング療法は、上記薬剤の単剤又は併用で行われました

Maude, SL. et al. N. Engl. J. Med. 378(5), 439, 2019

COI

□□□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□

Image



Image



Image



紹介元施設から治療施設宛の
キムリア患者紹介用フォーム

Image



キムリア治療施設向け
Webラーニング

Image

CellChain™ PRO

キムリア治療専用
オーダーシステム

Source URL: <https://prod.pro.novartis.com/jp-ja/products/kymriah/treatment/bridging>