

ADHD

**TSC**

ADHD

**ADHD**

ADHD


ADHD TAND TSC-associated neuropsychiatric disorder

ADHD

ADHD 1 4 6 40~70% 1,12-15) 5 25~50% 1,12-15) ADHD 30~60% 1,2,12-15) 1

Image

# 図1 精神遅滞の発現時期



大野耕作, 平山義人, 松井氏豊次郎, 編, 知的障害者の健康管理マニュアル, 東京: 診断と治療社, 2007; 83. 全田 眞理, 他, 日皮会誌 2018; 128: 1-16. より作図

1

	00000000	0000
00000000	400700	1030
000	250500	1040
ADHD	300600	50


Jozwiak S, et al. Eur J Paediatr Neurol 2011; 15: 424-431  
 00000000. 0000000000 (000000000 3), 0000, 00000000, 0000, 2008,p.204  
 Holmes GL, et al. Epilepsia 2007; 48: 617-630  
 D'Agati E, et al. J Child Neurol 2009; 24: 1282-1287  
 0000, 0. Pharma Medica 2012; 30: 15-19







図5 結節性硬化症患者のIQ分布 (海外データ)



TSC: 結節性硬化症

Joinson C, et al. Psychol Med 2003; 33: 335-344

知能障害

約4割の患者に知的障害を伴う(8)。

ADHD

ADHDは、TSC患者に多く見られる神経精神障害の一つである。ADHDは、不注意、多動性、衝動性などの症状を特徴とする。TSC患者にADHDを伴う割合は、一般集団に比べて約1.5倍高いと報告されている(2)。

TAND

TAND(TSC-associated neuropsychiatric disorder)は、TSC患者に特有の神経精神障害を指す。

は

知能障害

10) TAND  
11) TAND 9)

ADHD

- 1) 2008; 118: 1667-1676
- 2) D’Agati E, et al. J Child Neurol 2009; 24: 1282-1287
- 3) 22
- 4) Wataya-Kaneda M, et al. PLoS ONE 2013; 8: e63910
- 5) Napolioni V, et al. Brain Dev 2009; 31: 104-113
- 6) Curatolo P, et al. Lancet 2008; 372: 657-668
- 7) Joinson C, et al. Psychol Med 2003; 33: 335-344
- 8) Curatolo P, et al. J Child Neurol. 2010; 25: 873-880
- 9) de Vries PJ, et al. Pediatr Neurol 2015; 52: 25-35
- 10) 2016
- 11) 2018; 128: 1-16
- 12) Jozwiak S, et al. Eur J Paediatr Neurol 2011; 15: 424-431
- 13) 3), 2008, p.204
- 14) Holmes GL, et al. Epilepsia 2007; 48: 617-630
- 15) Pharma Medica 2012; 30: 15-19

Source URL: [https://prod.pro.novartis.com/jp-ja/products/afinitor/tsc/symptom\\_05](https://prod.pro.novartis.com/jp-ja/products/afinitor/tsc/symptom_05)