


高コレステロール血症と管理目標値

高コレステロール血症とは なんですか？

血液中のコレステロール(脂質)が増えすぎた状態のことをいいます。


- LDLやHDLは脂質とタンパク質が合わさったもので、LDLは肝臓で作られたコレステロールを「全身に運ぶ」役割を、HDLは血液中の余分なコレステロールを「肝臓に戻す」役割を担っています¹⁾。
- このバランスが崩れ、血液中のLDLコレステロール量が多くなることを、「高コレステロール血症」といいます。

1) 日本動脈硬化学会, 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022年版, p.22



LDLコレステロール値が高い状態が続くと、 脳心血管病のリスクが高まります。

〈イメージ図〉



脳心血管病(心筋梗塞、脳梗塞など)

LDLコレステロール値が高いと
心筋梗塞
(心臓の血管がつまる)
発症リスクが
3.8倍²⁾



LDLコレステロール値が高いと
脳梗塞
(脳の血管がつまる)
3年以内の再発率は
26.7~40.2%³⁾




2) Imano H, et al. Prev Med. 2011; 52(5): 381-386. 3) Ishihara M, et al. Circ J. 2017; 81(7): 958-965.

LDLコレステロール管理目標値を 一緒に確認しましょう！


LDLコレステロール値が高くなると、動脈硬化になりやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞になる危険性が高まることが知られています。下記のような動脈硬化になりやすい要因がある方には、より厳格なLDLコレステロール管理がすすめられています^{4,5)}。

● 今までに
心筋梗塞や脳梗塞に
かかったことがある方



● **糖尿病の方**

● **家族性
高コレステロール血症の方** など



管理目標値をめざして治療していきましょう！

4) 日本循環器学会, 2022年JCSガイドラインフォーカスアップデート版 安定冠動脈疾患の診断と治療, p.30-31
5) 日本動脈硬化学会, 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022年版, p.69

製造販売(輸入) (文献請求先及び問い合わせ先)

ノバルティス ファーマ株式会社
東京都港区虎ノ門1-23-1 〒105-6333

ノバルティス ダイレクト 販売情報提供活動に関するご意見
TEL: 0120-003-293 TEL: 0120-907-026
受付時間: 月~金 9:00~17:30 (祝日及び当社休日を除く)



レクビオ®による治療

高コレステロール血症治療薬レクビオ


これまでの治療薬とは異なるはたらきを持つ、世界80カ国以上で承認されている新しいお薬です。

LDLコレステロール管理目標値をめざす治療に用いるお薬です。

レクビオのはたらき


LDLコレステロールが高い状態

(イメージ図)



レクビオはどのように働きます

(イメージ図)



1) Turley SD, et al. J Lipid Res. 1995; 36(1): 67-79. 2) Abifadel M, et al. Nat Genet. 2003; 34(2): 154-156.

レクビオの効能又は効果
家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症 ただし、以下のいずれも満たす場合に限る。・心血管イベントの発現リスクが高い ・HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分、又はHMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない

レクビオの用法及び用量
通常、成人にはインクリシランナトリウムとして1回300mgを初回、3ヵ月後に皮下投与し、以降6ヵ月に1回の間隔で皮下投与する。


投与方法

レクビオは、医療従事者が皮下投与する注射剤で、初回、3ヵ月後、その後6ヵ月ごとに投与します。



医療従事者による投与(皮下注射)


初回、3ヵ月後、その後6ヵ月ごとに投与



LDLコレステロールをしっかりと下げるために、スケジュールを確認してレクビオの投与を継続していきましょう!

このような症状が出る場合があります

レクビオの主な副作用は、注射部位の反応(注射した場所が痛くなったり、赤くなったり、発疹がでたりするなどの症状)や肝機能障害でした。



レクビオ®皮下注300mgシリンジ
電子添文 2023年9月作成(第1版)

LEQ00002CI0001
2023年9月作成